

直播病害虫防除

6月

●全品種

1. 6月中旬

オリブライト1キロ粒剤

(いもち病・紋枯病
白葉枯病
1kg/10a)

7月

8月

早生

てんたかく

| | 2.出穂直前 | 3.穂揃期 |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 粉剤体系 | ノンブラストレボン粉剤DL (いもち病・ごま葉枯病 カメムシ類・ウンカ・ヨコバイ類) 4kg/10a | ラブサイドキラップ粉剤DL (いもち病・カメムシ類 ウンカ類) 4kg/10a (収穫14日前まで) |
| 液剤体系 | ノンブラスフロアブル トレボン乳剤 1,000倍 150ℓ/10a | ラブサイドフロアブル キラップフロアブル 1,000倍 150ℓ/10a (収穫14日前まで) |

中生

コシヒカリ

| | 2.出穂直前 | 3.穂揃期 |
|------|----------------------|-------------------------|
| 粉剤体系 | ノンブラストレボン粉剤DL | ラブサイドキラップ粉剤DL |
| 液剤体系 | ノンブラスフロアブル トレボン乳剤 | ラブサイドフロアブル キラップフロアブル |

晩生

てんこもり

| | 2.出穂直前 | 3.穂揃期 |
|------|----------------------|-------------------------|
| 粉剤体系 | ノンブラストレボン粉剤DL | ラブサイドキラップ粉剤DL |
| 液剤体系 | ノンブラスフロアブル トレボン乳剤 | ラブサイドフロアブル キラップフロアブル |

●粒剤体系 果樹園地や住宅地付近のほ場での農業飛散防止対策です。

| ①6月中旬 | ②出穂5~10日前 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| オリブライト1キロ粒剤 (いもち病・紋枯病・白葉枯病) 1kg/10a | コラトップダントツ1キロ粒剤 (いもち病・カメムシ類) 1kg/10a |

・散布後4~5日間は湛水状態を保ち、7日間は落水しないでください。
・カメムシが多発した場合はエルサン粉剤3DLで対応してください。

◆各品種の生育に応じて散布して下さい。
◆本田基本防除剤は、農業共済組合の補助対象農薬です。水稻作付面積に応じて配達させていただきます。

直播除草体系 (除草効果を高めるには水管理が重要です。除草剤散布後7日間は落水しない。)

初期

中期

後期剤

イネの2葉期以降、ノビエ2.5葉期まで

リボルバーエース1キロ粒剤 (1kg/10a) (ヒエが多く残った場合)

トップガンGT1キロ粒剤51 (1kg/10a) (ホタルイ、カヤツリグサ、コナギなどが多い場合)

イネの5葉期以降、ノビエ3葉期まで

ザーベックスDX1キロ粒剤 (1kg/10a)

マメットSM1キロ粒剤 (1kg/10a)

入水直後(播種1週間後頃)、ノビエ2葉期まで

キックバイ1キロ粒剤 (1kg/10a)

●ノビエ専用剤

ヒエクリーン1キロ粒剤 (1kg/10a)
イネ3葉期以降、ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)
クリンチャー1キロ粒剤 (1kg/10a)
播種後10日~、ノビエ3葉期まで (収穫30日前まで)

●ノビエ+多年生広葉雑草等

クリンチャーバスメ液剤 (1ℓ/10a)
希釈水量70~100ℓノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)
・落水してから散布し3~4日間は入水しない。

●クサネム+イボクサ

ノミニー液剤 (100ml/10a)
希釈水量100ℓイネ4葉期以降 (収穫60日前まで)
・落水状態で散布し3日間は入水しない。

畦畔・農道の除草体系 (除草に努め、カメムシ被害を防止)

◎除草剤の使用体系 (散布濃度は中圧スプレー20ℓに水和剤は50g、液剤は200ccを目安に希釈して下さい。)

| | 12月~2月の寒い時 | 5月 中旬 | 7月以降 |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水田畦畔 | カソロン粒剤6.7 3月~4月 ハイバーX | バスタ液剤(※) ラウンドアップマックスロード(※) カーメックス-D水和剤 | バスタ液剤(収穫7日前まで)(※) ザクサ液剤(収穫7日前まで)(※) ラウンドアップマックスロード(※) (収穫前日まで) 三共の草枯らし(収穫14日前まで)(※) |
| 農道 | X (使用しない) | ● | ● |

注意事項

- 1) 作物の生育中に散布する薬剤は飛散しないようにする。
- 2) 散布後5時間以内に雨が降ると効果が劣ります。
- 3) カソロン粒剤6.7は暖かくなると効果が半減します。
冬期に散布すると5月中旬まで雑草は生えません。
またスギナの特効薬です。
- 4) (※)の除草剤はグリホサート及びグルホシネートPを含む剤であり、使用回数は2回以内です。

農薬の使用は、基準量・使用時期・回数を守り、安全に使いましょう。