

令和8  
年産

# 水稻病害虫および雑草基本防除こよみ

## 移植水稻病害虫防除

- 射水市農業技術者協議会
- 射水市
- JAIいみず野
- 富山県高岡農林振興センター
- 高岡地域農業共済センター
- 全農とやま

粉 剤

1回目		2回目	
薬剤名	ビームスタークル粉剤5DL	ラブサイドキラップ粉剤DL	
効果	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	
散布量	4kg/10a	4kg/10a	
早生 てんたかく	穂揃期 (7月17日頃)	傾穂期 (7月24日頃)	
中生 コシヒカリ	出穂期 (8月1日頃)	穂揃期～傾穂期 (8月8日頃)	
晚生 てんこもり 新大正糯	出穂直前 (8月3日頃) (8月12日頃)	穂揃期 (8月10日頃) (8月19日頃)	

※収穫14日前まで

液 剤

1回目		2回目	
薬剤名	ビームエイトスタークルゾル	ラブサイドK2フロアブル	
効果	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	いもち病、カメムシ類	
散布量	1,000倍 150ℓ/10a	1,000倍 150ℓ/10a	
早生 てんたかく	穂揃期 (7月17日頃)	傾穂期 (7月24日頃)	
中生 コシヒカリ	出穂期 (8月1日頃)	穂揃期～傾穂期 (8月8日頃)	
晚生 てんこもり 新大正糯	出穂直前 (8月3日頃) (8月12日頃)	穂揃期 (8月10日頃) (8月19日頃)	

※収穫14日前まで

粒 剤

薬剤名	フジワンラップ粒剤
効果	いもち病、カメムシ類、ウンカ類
散布量	4kg/10a
中生 コシヒカリ	出穂の10～12日前 (7月21日頃)
晚生 てんこもり 新大正糯	出穂の10～12日前 (7月25日頃) (8月1日頃)



※粒剤の散布は、3～5cmの湛水状態で田面に均一に散布し、散布後7日間は落水しない。

## 移植水稻除草体系

除草効果を高めるには水管理が重要です。  
除草剤散布後7日間は落水しない。

