

# 令和7年産 直播病害虫および雑草基本防除こよみ

## 直播病害虫防除

- 射水市農業技術者協議会 ● 射水市
- JAいみず野 ● 富山県高岡農林振興センター
- 高岡地域農業共済センター ● 全農とやま

|     |      |               |
|-----|------|---------------|
| 全品種 | 薬剤名  | オリブライト250G    |
|     | 効果   | いもち病、紋枯病      |
|     | 散布量  | 250g/10a      |
|     | 散布時期 | 6月下旬(葉いもち初発前) |

※乾田直播でFS処理済の種子を使用している場合は、散布不要です。  
 ※JAの乾田直播、カルバー直播種子はFS処理をしているので、散布不要です。

|    | 1回目     | 2回目             |                 |
|----|---------|-----------------|-----------------|
| 粉剤 | 薬剤名     | ビームスタークル粉剤5DL   | ラブサイドキラップ粉剤DL   |
|    | 効果      | いもち病、カメムシ類、ウンカ類 | いもち病、カメムシ類、ウンカ類 |
|    | 散布量     | 4kg/10a         | 4kg/10a         |
|    | 中生コシヒカリ | 出穂直前            | 穂揃期             |
|    | 晩生てんこもり | 出穂直前            | 穂揃期             |


※収穫14日前まで

|    | 1回目     | 2回目             |                 |
|----|---------|-----------------|-----------------|
| 液剤 | 薬剤名     | ビームエイトスタークルゾル   | ラブサイドK2フロアブル    |
|    | 効果      | いもち病、カメムシ類、ウンカ類 | いもち病、カメムシ類      |
|    | 散布量     | 1,000倍 150ℓ/10a | 1,000倍 150ℓ/10a |
|    | 中生コシヒカリ | 出穂直前            | 穂揃期             |
|    | 晩生てんこもり | 出穂直前            | 穂揃期             |

※収穫14日前まで

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| 粒剤 | 薬剤名     | フジワンラップ粒剤       |
|    | 効果      | いもち病、カメムシ類、ウンカ類 |
|    | 散布量     | 4kg/10a         |
|    | 中生コシヒカリ | 出穂の10~12日前      |
|    | 晩生てんこもり | 出穂の10~12日前      |

※粒剤の散布は、3~5cmの湛水状態で田面に均一に散布し、散布後7日間は落水しない。




## 直播除草体系

除草効果を高めるには水管理が重要です。除草剤散布後7日間は落水しない。

### 〈湛水〉


雑草が少ない場合



※鉄コーティング直播で雑草が多い場合は播種時にペルーガ1キロ粒剤を散布して下さい。  
 ※カルバー直播で、雑草が多い場合は田干し後入水してからペルーガ1キロ粒剤を散布して下さい。

### 〈乾田〉

雑草が多い場合(イボクサ含む)



### 後期剤

- **ノビエ専用剤**  
 ヒエクリーン1キロ粒剤 (1kg/10a)  
 イネ3葉期~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)  
 トドメMF1キロ粒剤(1kg/10a)  
 イネ3.5葉期~ノビエ4葉期(収穫50日前まで)  
 トドメMF乳剤(200ml/10a)  
 播種後10日~ノビエ6葉期(収穫50日前まで)
- **ノビエ+多年生広葉雑草等**  
 クリンチャーバスME液剤(1000ml/10a)  
 希釈水量70~100ℓ  
 播種後10日~ノビエ5葉期(収穫50日前まで)
- **トドメバスMF液剤**(1000ml/10a)  
 希釈水量100ℓ  
 播種後10日~ノビエ6葉期(収穫50日前まで)
- **ロイヤント乳剤**(使用回数1回)
- **ワイドアタックSC**(100ml/10a)  
 希釈水量100ℓ  
 イネ3葉期~ノビエ5葉期(収穫30日前まで) ※無人航空機による散布可能
- **多年生広葉雑草等**  
 バサグラン粒剤(3kg/10a)  
 イネ3葉期~入水50日後(収穫60日前まで)
- **クサネム+イボクサ**  
 ロイヤント乳剤(200ml/10a)  
 希釈水量100ℓ  
 イネ3葉期~(収穫45日前まで)