

令和8年産 直播病害虫および雑草基本防除こよみ

直播病害虫防除

- 射水市農業技術者協議会 ● 射水市
- JAIみず野 ● 富山県高岡農林振興センター
- 高岡地域農業共済センター ● 全農とやま

全品種	薬 剤 名	オリブライト250G
	効 果	いもち病、紋枯病
	散 布 量	250g/10a
	散 布 時 期	6月下旬(葉いもち初発前)


※乾田直播でFS処理済の種子を使用している場合は、散布不要です。
※JAの乾田直播、カルバー直播種子はFS処理をしているので、散布不要です。

粉 剤	1 回目		2 回目	
	薬 剤 名	ビームスタークル粉剤5DL	ラブサイドキラップ粉剤DL	
	効 果	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	
	散 布 量	4kg/10a	4kg/10a	
	中 生 コシヒカリ	出穂期	穂揃期～傾穂期	
	晩 生 てんこもり	出穂直前	穂揃期	
※収穫14日前まで				

液 剤	1 回目		2 回目	
	薬 剤 名	ビームエイトスタークルゾル	ラブサイドK2フロアブル	
	効 果	いもち病、カメムシ類、ウンカ類	いもち病、カメムシ類	
	散 布 量	1,000倍 150ℓ/10a	1,000倍 150ℓ/10a	
	中 生 コシヒカリ	出穂期	穂揃期～傾穂期	
	晩 生 てんこもり	出穂直前	穂揃期	
※収穫14日前まで				

粒

※粒剤の散布は、3～5cmの湛水状態で田面に均一に散布し、散布後7日間は落水しない。



直播除草体系

除草効果を高めるには水管理が重要です。
除草剤散布後7日間は落水しない。

〈湛水〉


雑草が
少ない
場合

初 中 期 剤	中 期 剤
イネの1.0葉期以降(播種16～20日後) ベッカク1キロ粒剤 (1kg/10a)ノビエ3葉期まで (ホタルイ、カヤツリグサ、コナギなどが多い場合) イネの1.0葉期以降(播種16～20日後) アクシズMX1キロ粒剤 (1kg/10a)ノビエ4葉期まで (残効が長い、ホタルイ、ミズガヤツリが多い場合)	イネの5葉期以降 ザーベックスDX1キロ粒剤 (1kg/10a)ノビエ3葉期まで ブイゴールSM1キロ粒剤 (1kg/10a)ノビエ3葉期まで イネの1.0葉期以降 ノックアウト楽粒 (250g/10a)ノビエ3.5葉期まで

※鉄コーティング直播で雑草が多い場合は播種時にペルーガ1キロ粒剤を散布して下さい。
※カルバー直播で、雑草が多い場合は田干し後入水してからペルーガ1キロ粒剤を散布して下さい。

〈乾田〉

雑草が
多い
場合
(イボクサ
含む)



後 期 剤

●ノビエ専用剤

ヒエクリーン
1キロ粒剤
(1kg/10a)
イネ3葉期～ノビエ4葉期(収穫45日前まで)

トドメMF1キロ粒剤(1kg/10a)
イネ3.5葉期～ノビエ4葉期(収穫50日前まで)

トドメMF乳剤(200ml/10a)
播種後10日～ノビエ6葉期(収穫50日前まで)

●ノビエ+多年生広葉雑草等

クリンチャーバスME液剤(1000ml/10a)
希釈水量70～100ℓ
播種後10日～ノビエ5葉期(収穫50日前まで)

トドメバスMF液剤(1000ml/10a)
希釈水量100ℓ
播種後10日～ノビエ6葉期(収穫50日前まで)

ワイドアタックSC(100ml/10a)
希釈水量100ℓ
イネ3葉期～ノビエ5葉期(収穫30日前まで) ※無人航空機による散布可能

●多年生広葉雑草等

バサグラン粒剤(3kg/10a)
イネ3葉期～入水50日後(収穫45日前まで)

●クサネム+イボクサ

ロイアント乳剤(200ml/10a)
希釈水量100ℓ
イネ3葉期～(収穫45日前まで)