

田植後の活着は、てんたかく、コシヒカリともに概ね順調です。
 今後は、溝掘りと中干しを適期に実施し、稲体と根の健全化を図りましょう。

1 溝掘りと中干し

田植後3週間目頃から

軽い田干し

溝掘り

田植後4週間までに

中干し開始



<中干し完了の目安>
 くるぶしまで沈む程度
 半湿田はやや強めに！
 砂質田はやや控えめに！



中干し程度による根量の違い。

- ・排水不良田では畦際にも溝を掘り、確実に水尻に連結する。
- ・適期中干しで、弱小分けつの抑制と根の伸長促進をはかる。

2 中干し後は、幼穂形成期頃まで「間断かん水」

- ・湛水と落水を繰り返すことで土壤に酸素と水を供給し、根の発達を促しましょう。
- ・幼穂形成期までに足あとの深さが3cm程度になるよう地固めする。

3 後期除草剤の散布 ～雑草が残っている場合は早めに散布～

対象雑草	薬剤名	使用量(/10a)	使用時期	注意事項
ノビエ	ヒエクリーン1和粒剤	1kg	移植後15日～ 収穫45日前まで	ノビエ4葉期まで。 湛水散布。(1回のみ)
	トドメMF1和粒剤	1kg	移植後14日～ 収穫50日前まで	ノビエ5葉期まで。湛水散布。 (3回以内)
	トドメMF乳剤 (雑草の茎葉に散布)	200ml /水 100L	移植後14日～ 収穫50日前まで	ノビエ7葉期まで。 ごく浅水が落水状態で止め水し、散布後 3～4日は入水しない。また、湛水散布 の場合は3～4日は湛水状態を保つ。(2 回以内)
1年生広葉雑草等 (イネ科を除く)	バサグラン粒剤	3～4kg	移植後15～50日 収穫60日前まで	ごく浅水が落水状態で止め水し、散布後 3～4日は入水しない。(1回のみ)
ノビエ 1年生広葉雑草等	トドメバスMF液剤 (雑草の茎葉に散布)	1000ml/水 100L	移植後15日～ 収穫50日前まで	ノビエ6葉期まで。 ごく浅水が落水状態で止め水し、散布後 3～4日は入水しない。(2回以内)
	ワイドアタックSC (雑草の茎葉に散布)	100ml /水 100L	移植後20日～ (イネ5葉期～) 収穫30日前まで	ノビエ6葉期まで。 ごく浅水が落水状態で止め水し、散布後 3～4日は入水しない。(2回以内)
ノビエ クサネム イボクサ	ロイヤント乳剤 (雑草の茎葉に散布)	200ml /水 100L	移植後20日～ 収穫45日前まで	ごく浅水が落水状態で止め水して散布。 浅水散布の場合、散布後3～4日は入水 しない。落水散布の場合は早め(3日 以内)に入水。(2回以内)

作業が終わったら、生産履歴を記入しましょう。