稲作情報　第4号

令和７年５月23日
射水市農業技術者協議会

田植後の活着は、てんたかく、コシヒカリともに概ね順調です。
溝掘りと中干しを適期に実施し、稲体と根の健全化を図りましょう。

１　溝掘りと中干し

田植後３週間目頃から

軽い田干し　溝掘り

田植後４週間までに

中干し開始

くるぶしまで沈む程度
半湿田はやや強めに！
砂質田はやや控えめに！

中干し完了の目安

・排水不良田では畦際にも溝を掘り、確実に水尻に連結しましょう。
・適期中干しで、弱小分げつの抑制と根の伸長促進を図りましょう。

２　中干し後は、幼穂形成期頃まで「間断かん水」

・湛水と落水を繰り返すことで土壌に酸素と水を供給し、根の発達を促しましょう。
・幼穂形成期までに足あとの深さが3cm程度になるよう地固めしましょう。



中干し程度による根量の違い

３　後期除草剤の散布

～雑草が残っている場合は早めに散布しましょう～

（後期除草剤の種類と適用雑草等は次ページ）

こまめに水分や塩分を補給する等して、熱中症の予防につとめましょう。

【お問い合わせ先】
JAいみず野営農指導課　TEL:52-6805　　高岡農林振興センター射水班　TEL:26-8478
JAいみず野ホームページ　http://www.ja-imizuno.or.jp

○後期除草剤の種類と適用雑草、使用方法等

対象雑草	農　薬　名	使用量 (/10a)	使 用 時 期	使 用 方 法 ・ 注 意 事 項
ノビエ	ヒエクリーン 1キロ粒剤	1kg (1回のみ)	移植後 15 日～ ノビエ4葉期 収穫 45 日前まで	**湛水散布。** 散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしない。かけ流しはしない。
	トドメMF 1キロ粒剤	1kg (3回以内)	移植後 14 日～ ノビエ5葉期 収穫 50 日前まで	**湛水散布。** 散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしない。かけ流しはしない。
	トドメMF 乳剤	200mℓ/ 水 100L (2回以内)	移植後 14 日～ ノビエ7葉期 収穫 50 日前まで	**雑草の茎葉に均一に散布する。** ごく浅水か落水状態で止め水し、散布後3～4日は入水しない。 湛水散布の場合は、少なくとも3～4日は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
1年生広葉雑草等 (イネ科を除く)	バサグラン 粒剤	3～4kg (1回のみ)	移植後 15～50 日 収穫 45 日前まで	晴天の持続する時(2日以上)を選んで使用する。ごく浅水か落水状態で止め水し、散布。散布後3～4日間は入水、落水しない。
ノビエ 1年生広葉雑草等	トドメバス MF液剤	1000 ㎖/ 水 100L (2回以内)	移植後 15 日～ ノビエ6葉期 収穫 50 日前まで	**雑草の茎葉に均一に散布する。** ごく浅水か落水状態で止め水し、散布後3～4日は入水しない。 **展着剤は加えないこと。**
	ワイドアタック SC	100mℓ/水 100L (2回以内)	移植後 20 日(イネ5葉期以降)～ ノビエ6葉期 収穫 30 日前まで	**雑草の茎葉に均一に散布する。** 晴天の持続する時(1日以上)を選んで使用する。 ごく浅水か落水状態で止め水し、散布後3～4日は入水しない。
ノビエ クサネム イボクサ	ロイヤント 乳剤	200mℓ/水 100L (2回以内)	移植後 20 日～ ノビエ5葉期 収穫 45 日前まで	**雑草の茎葉に均一に散布する。** ごく浅水か落水状態で止め水して散布。土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されないことがあるため、落水状態で散布する際は散布後3日以内に入水する。 **展着剤は加えないこと。**

作業が終わったら、生産履歴を記入しましょう。