

乾田V溝直播情報(第5号)

令和7年7月18日
射水市農業技術者協議会

【生育状況】

- ・コシヒカリの幼穂形成期は、平年より1日早い7月15日頃、出穂期は8月4日頃の見込み。
- ・富富富の幼穂形成期は、近年より3日遅い7月20日頃、出穂期は8月10日頃の見込み。
- ・圃場による生育差が大きいので、必ず出穂状況を確認して、適期防除に努めましょう。

＜生育ステージ＞

コシヒカリ(射水市内2か所)

年度	播種日	幼穂形成期	出穂期(予想)
R7	4/19	7/15	(8/4)
R6	4/19	7/15	8/3
平年※1	4/18	7/16	8/6

※1 H27～R6の平均値

富富富(射水市内2か所)

年度	播種日	幼穂形成期	出穂期(予想)
R7	<u>4/29</u>	(7/20)	(8/10)
R6	4/21	7/18	8/9
近年※2	4/15	7/17	8/7

※2 R2～R6の平均値

【今後の管理】

1 病害虫対策

(1)コシヒカリ(8月4日出穂の場合)

散布時期	1回目防除 : 出穂期(8/4頃)	2回目防除 : 穂揃～傾穂期(8/11頃)
粉剤	ビームスタークル粉剤5DL 4kg/10a	ラブサイドキラップ粉剤DL 4kg/10a
液剤	ビームエイトスタークルゾル ブーム等 1,000倍 150ℓ/10a ドローン 8倍 0.8ℓ/10a	ラブサイドK2フロアブル ブーム等 1,000倍 150ℓ/10a ドローン 8倍 0.8ℓ/10a

(2)富富富(8月10日出穂の場合)

散布時期	1回目防除 : 出穂期(8/10頃)	2回目防除 : 穂揃～傾穂期(8/17頃)
粉剤	ビームスタークル粉剤5DL 4kg/10a	キラップ粉剤DL 4kg/10a
液剤	ビームエイトスタークルゾル ブーム等 1,000倍 150ℓ/10a ドローン 8倍 0.8ℓ/10a	キラップフロアブル ブーム等 1,000倍 150ℓ/10a ドローン 8倍 0.8ℓ/10a

※風の少ない朝方又は夕方に、薬剤が株元まで確実に付着するように散布しましょう。

※散布間隔は7日を基本とし、10日以上空けないように、計画的に防除しましょう。

2 水管理

- ・葉色を維持するため、収穫の5～7日前までに湛水管理(水深5cm以上)を維持しましょう。
- ・高温の場合は2～3日で水を入れ替えましょう。

3 追肥

・原則、追肥は必要ありません。

品種	判断基準 (出穂7～10日前頃の葉色)	施用時期		肥料名 施用量	目標葉色 (穂揃期)
コシヒカリ	7/25～7/28頃に4.0以下 (砂壤土は4.2以下)	走り穂が 見える頃	8/1頃まで	「追肥3号」または 「流し込み追肥化成らくらく」 7kg/10a	4.2～4.5
富富富	7/31～8/3頃に4.2以下	までに	8/7頃まで		4.4

【お問い合わせ先】

JAいみず野営農指導課 TEL52-6805 高岡農林振興センター農業普及課射水班 TEL26-8478
JAいみず野ホームページ <http://www.ja-imizuno.or.jp/>