

1 代かき

- ・代かきから播種までの日数は、粘質土で3~4日、壤質・砂質土で2~3日とする。
- ・代かき時は、圃場を練り過ぎないように注意し、稲株や雑草を確実にすき込む。

2 播種作業

(1) 播種時の土壌硬度

- ・ゴルフボールを1mの高さから落とした時に、ボールの上端が田面より0~1cm沈む程度となるよう落水のタイミングを考慮する。

(2) 播種作業

- ・播種量及び施肥量が適正になるよう播種機を調整する(表1)。
- ・栽植密度は60~70株/坪に設定する。
- ・種子や肥料の落下量を適宜確認する。

目標苗立本数
60本/m²
(12~24本/m)

表1 施肥量及び播種量の目安


土壌区分	肥料名	施用量	播種量	播種深度
粘質土	LPss 直播	27kg/10a	乾粃	土中
壤質・砂質土	コシヒカリ	30kg/10a	2.7kg/10a	5~10mm

3 播種後の水管理

- ・播種作業でできた溝と排水溝を連結し、表面排水を促す。
- ・播種後は圃場全体に軽い亀裂が入るまで5日間程度田干しを行う。
- ・田干し後は入水し、浅水管理(水深2~3cm)とする。

4 除草剤散布

- ・雑草の発生状況に応じて下記の除草体系を参考に、遅れないよう散布する。



3/1~5/31 春の農作業安全運動実施中

【お問い合わせ先】

JA いみず野営農指導課 TEL:52-6805 高岡農林振興センター射水班 TEL:26-8478

JA いみず野ホームページ <http://www.ja-imizuno.or.jp>